

Notice Élevage Chatterie

Ambre & Soie

Madame, Monsieur,

Vous venez d'acquérir un chaton de race ABYSSIN. Ce chat a l'aspect d'une peluche, mais n'en est pas une ! C'est un petit être vivant qui va dépendre entièrement de vous pour son alimentation, son éducation, son entretien, sa santé et son bien-être. À vous d'en faire VOTRE chat en respectant les règles élémentaires.



LES PAPIERS

La carte de transpondeur

C'est une carte sur laquelle figure le numéro de transpondeur (puce électronique) de votre chat et vos noms, adresse, et numéro de téléphone. Elle est éditée par le fichier central I-CAD qui détient donc les mêmes renseignements informatisés. Ces informations permettent de vous retrouver si vous perdez votre chat : la personne qui le trouve lit son tatouage, téléphone au fichier central I-CAD, et vous contacte pour vous le restituer.

Il est donc très important de modifier vos coordonnées si vous déménagez ou changez de nom ou de numéro de téléphone. Il suffit alors de vous connecter sur le site : i-cad.fr en tant que détenteur, au moyen de l'identifiant et du mot de passe qui figurent en haut à gauche sur la carte I-CAD que vous recevrez de l'I-CAD, service de gestion des identifications des chiens et chats, et de faire les modifications en ligne.

Le pedigree

Votre chat est inscrit au LOOF. Il peut, dès l'achat, posséder son certificat de naissance ; il peut aussi ne le recevoir que plus tard, dans un délai de 6 mois si le LOOF ne l'a pas encore édité. Il s'agit d'un document sur lequel figurent les noms, numéros de LOOF des père, mère, grands-parents, et arrière-grands-parents de votre chat.

Le carnet de santé

Ce document donne toutes les indications sur les vaccinations effectuées sur l'animal. Vous devez également y noter les maladies et traitements du chat, les dates des chaleurs, des opérations, des protocoles de vermifugation, des saillies et mises-bas, etc.

Le passeport

Idem au carnet de santé, mais c'est LE document officiel sur lequel sont inscrites les vaccinations antirabiques. Ce document est indispensable pour que votre chat puisse voyager dans d'autres pays.

L'arrivée du chaton

Il est fortement conseillé de ne pas lui ouvrir tout l'espace de votre maison. Il faudra d'abord lui présenter ses toilettes, son accès à l'eau et à la nourriture ainsi qu'un espace de 20 m² qui lui permettra de se familiariser avec les bruits, odeurs, et territoires. N'oubliez pas qu'il vient de quitter sa maman et qu'il doit appréhender de nouvelles expériences. Il sera ainsi rassuré et cela vous permettra de voir son adaptation. Si vous constatez qu'il s'adapte sans problème, vous pourrez lui faire découvrir le reste de son territoire.

Nous vous mettons également en garde de ne pas laisser le chaton dehors dans les premiers jours de son arrivée chez son acquéreur afin qu'il s'habitue à vous. Si vous souhaitez laisser votre chaton sortir à l'extérieur, il est conseillé de le faire, mais pas avant une période de six mois, au début sous votre surveillance, muni d'un harnais et dûment protégé contre les puces et tiques (pipette anti-puce et non collier).

Si vous possédez un (d')autre(s) chat(s), il est IMPÉRATIF de faire une période de quarantaine de 2 semaines avant de mettre le chaton en contact avec lui (eux) et de les vermifuger tous en même temps. Tenez portes et fenêtres fermées, faites attention à ne pas laisser une casserole d'eau avec la queue vers l'extérieur ; le chaton, en jouant, peut se renverser l'eau sur lui. Attention aux encoignures de portes, les chatons ont tendance à jouer et peuvent avoir les pattes fracturées. Rangez vos médicaments (aspirine, doliprane et autres) qui sont mortels, oubliez le chocolat qui est mortel, ainsi que les plantes type ficus, azalées, lys, qui sont également mortelles.

Si vous voulez un chat affectueux, gardez-le sur vos jambes ou près de vous lorsqu'il vient. Invitez-le par des appels, des jeux. Embrassez-le et manipulez-le régulièrement pour qu'il se laisse soigner. Brossez-le avec un gant à picots dans le sens du poil pour l'habituer à être touché et il aura un beau pelage brillant.

Les maladies du chat

Avant d'évoquer les différentes maladies du chat et les zoonoses transmissibles entre humain et chat, voici quelques symptômes qui doivent éveiller votre attention et vous pousser à surveiller votre chat, à le traiter, voire à l'emmener chez le vétérinaire.

- Un changement de comportement : ne joue plus, reste prostré dans un recoin ou se cache, perte d'appétit, a le poil ébouriffé et le regard terne, triste. Une prise de température peut vous donner une indication, sa température normale se situe entre 38 °C et 39 °C.
- Un amaigrissement important est à surveiller.
- Des muqueuses (gencives, babines, etc.) pâles, un rythme cardiaque trop rapide, un chat qui s'essouffle.
- Vomissements importants et fréquents (vomir une boule de poil ou un peu de bile est fréquent et normal), diarrhée permanente (surtout si teintée de sang), constipation.
- Une soif beaucoup plus importante.
- Une mauvaise haleine soudaine ou importante. Il a des convulsions et bave.
- Des douleurs et boiteries.
- Une anurie (chat qui urine peu ou pas) ou une trop grande fréquence de mictions (surtout si teintées de sang).
- Des pertes de poils et apparition des plaques sans poils.

Les principales maladies

- **Le coryza (rhinotrachéite virale féline) (herpes virus)** : La maladie la plus fréquente chez le chat, elle est due à un virus ; grave et très contagieuse, elle est à l'origine d'épidémies. Elle incube de 2 à 4 jours avec des éternuements, le nez et les yeux qui coulent, conjonctivite et fièvre. Le chat a des ulcérations sur la langue et les gencives et a du mal à déglutir. Puis la maladie peut évoluer avec une pneumonie et des atteintes graves aux yeux, puis la mort. Le chat ne mange plus et reste prostré. Il doit être soigné le plus vite possible. Il existe un vaccin qui le protège, mais pas totalement (CVR C).
- **Le calicivirus (FCV)** : Virus de la famille Caliciviridae qui est responsable de la calicivirose chez les chats. C'est l'une des deux infections respiratoires les plus importantes chez les chats. Le FCV

peut être identifié chez environ 50 % des infections respiratoires félines. Il existe un vaccin (CVR C).

- **La péritonite infectieuse féline (PIF)** : Due à un coronavirus, cette maladie est très contagieuse et atteint différents organes : foie, reins, cerveau, poumons, etc. Le chat ne mange pas, il a de la fièvre, il peut vomir, avoir de la diarrhée, des troubles respiratoires ou le ventre qui gonfle. Il n'y a pas de traitement et pas de vaccin. Cependant, le chat peut être porteur de ce coronavirus sans être malade pendant longtemps et déclarer la maladie brutalement. Cette maladie suscite encore de nombreuses interrogations. Le virus responsable de la PIF appartient à la famille des Coronaviridae (Coronavirus Félines). Il en existe de plusieurs sortes : virus peu nocifs (à tropisme digestif) et virus très virulents (agents de la péritonite infectieuse féline). Ces derniers résultent d'une mutation du virus peu nocif lors de sa multiplication au niveau de la muqueuse intestinale. Tous les chats sont confrontés durant leur vie à la présence de différents coronavirus. Leur présence ou apparition peut survenir suite à un stress, à une vaccination, à une maladie, à une diarrhée, etc. La maladie se caractérise par deux formes : la forme humide avec formation d'épanchements liquidiens et la forme sèche pouvant atteindre n'importe quel organe entraînant sa défaillance.

Il n'existe pas véritablement de test en mesure de poser un diagnostic de PIF (tous les tests coronavirus appelés à tort « tests PIF » réagissent de la même façon aux différents types de coronavirus, qu'ils soient mutants ou non). En revanche, des tests coronavirus permettent de supporter l'intérêt d'une suspicion ou non de la PIF au regard de leurs résultats en laboratoire en complément de l'examen clinique du chat. Ils peuvent être effectués par prise de sang ou par écouvillon rectal ou échantillon des selles afin d'évaluer si le chat est porteur d'un coronavirus, s'il excrète et à quelle hauteur.

Test positif ou négatif ? Si le chat a été en contact avec n'importe quelle forme de coronavirus, son système immunitaire produira des anticorps. Le test ne fait pas de différence entre les anticorps de la PIF ou de tout autre coronavirus. Un test positif indique simplement que le chat a créé des anticorps à une forme de coronavirus. De plus, 30 % des tests sont des faux positifs.

- **La chlamydie** : Maladie due à une bactérie, elle atteint les voies respiratoires du chat qui commence par développer une rhinite et une conjonctivite purulentes à un œil puis aux deux, le chat ne mange pas et maigrit. Les chatons risquent une pneumonie mortelle. Il existe un vaccin (CVR C) et le vétérinaire peut traiter avec des antibiotiques.
- **FIV (sida du chat)** : Maladie due à un rétrovirus (virus de l'immunodéficience) et il n'existe aucun vaccin, aucun traitement ; le pronostic est sombre. Transmis principalement par léchage, saillie

et allaitement ; cette maladie peut provoquer une tumeur maligne (lymphosarcome) dont le pronostic est sombre. Le virus peut être porté par le chat depuis longtemps sans qu'il soit visiblement malade : il faut surveiller tout amaigrissement, anémie, diarrhée chronique. Un test sanguin permet de détecter le virus. Le vétérinaire peut alors traiter les symptômes, mais ne peut pas éliminer le virus.

- **La leucose (FELV)** : Maladie due à un rétrovirus transmis principalement par léchage, saillie et allaitement ; cette maladie peut provoquer une tumeur maligne (lymphosarcome) dont le pronostic est sombre. Le virus peut être porté par le chat depuis longtemps sans qu'il soit visiblement malade : il faut surveiller tout amaigrissement, anémie, diarrhée chronique. Un test sanguin permet de détecter le virus. Un vaccin existe (Felv) et n'est efficace que sur un animal non infecté.
- **La rage** : Zoonose (maladie transmissible à l'homme) cette maladie virale mortelle est transmise par morsure, coup de griffe ou léchage, transmise par un rhabdovirus pénétrant l'organisme par les filets nerveux à partir de la morsure. L'animal n'est contagieux que les 15 jours précédant sa mort. Un chat atteint de rage va être agressif, chercher à mordre sans raison valable, bave anormalement. Il a la mâchoire inférieure paralysée ainsi que ses membres, puis il se paralyse totalement et meurt. Il n'existe aucun traitement, mais il y a un vaccin.
- **La panleucopénie infectieuse (typhus)** : Maladie contagieuse due à un virus, elle incube pendant 2 à 10 jours et elle est souvent mortelle chez le jeune chat. L'animal est prostré, vomit et a la diarrhée, les symptômes se voient souvent au dernier moment car la maladie évolue rapidement. Il existe un vaccin (CVR C).
- **La tuberculose** : Cette maladie est une zoonose et peut être transmise à l'animal par un humain infecté ; l'animal doit alors être euthanasié. Elle est transmise par le bacille de Koch.
- **La toxoplasmose** : Cette maladie est une zoonose et elle est due à un parasite (protozoaire) qui se reproduit dans l'intestin grêle du chat. Cette maladie peut entraîner de graves lésions de l'embryon d'une femme enceinte ne possédant pas d'anticorps.
- **Maladie d'Aujeszky** : Maladie due à la consommation de viande de porc infectée par le virus d'Aujeszky qui conduit à une encéphalite mortelle avec paralysie pharyngée. Il ne faut donc pas donner de viande de porc crue à votre chat (saucisson, jambon cru, abats, etc.).
- **La maladie des griffes de chat (lymphoréticulose bénigne d'inoculation)** : Est une zoonose transmise par le chat à l'humain par coup de griffe ; elle entraîne un abcès et des ganglions, parfois un peu de fièvre, et est soignée par antibiotique.

- **La pasteurellose** : Cette maladie est une zoonose transmise par morsure qui provoque une plaie chaude, rouge et douloureuse avec inflammation des ganglions et des articulations voisines, et de la fièvre. Le traitement est à base d'antibiotiques.
- **La yersiniose** : Cette maladie est une zoonose d'origine bactérienne qui atteint des chats qui mangent des oiseaux et des petits rongeurs et qui la transmettent par léchage.
- **L'anémie** : Diminution des globules rouges dans le sang : les muqueuses sont pâles, le chat est essoufflé, il est fatigué.
- **Le syndrome urologique félin (SUF)** : Ce sont les calculs de l'appareil urinaire, le plus souvent chez les chats mâles, le chat risque la crise d'urémie et il faut retirer chirurgicalement les calculs. Ils sont entre autres dus à l'excès de magnésium dans les croquettes « bas de gamme ».
- **Cystite** : Infection urinaire.
- **L'insuffisance rénale chronique** : Fréquente chez le chat âgé qui se met à boire beaucoup, à maigrir, a de la diarrhée, des vomissements, etc. Il faut lui donner une alimentation adaptée et des médicaments pour aider les reins à fonctionner.
- **La teigne** : Des plaques rondes sans poils de petites tailles indiquent une teigne. Ce sont des champignons microscopiques à l'origine de ces plaques. La maladie est très contagieuse entre chats, aux chiens, aux humains : il faut traiter le chat et son environnement.
- **La gale** : Très contagieuse et due à un parasite, elle provoque de terribles démangeaisons. Elle est souvent présente sur la tête et les oreilles. La gale des oreilles produit du cérumen marron foncé et le chat se gratte beaucoup les oreilles.
- **L'empoisonnement** : Attention aux plantes chez vous, de nombreuses plantes sont toxiques pour les chats. Attention aux médicaments oubliés sur une table, au sel (dans la neige fondue ou dans les saumures), au cacao, au café, à l'aspirine, aux anti-limaces, aux antigels, aux raticides, aux produits d'entretien, aux crapauds, etc.

Les maladies génétiques du British

Polykystose rénale

Il s'agit d'une maladie rénale qui se traduit par l'envahissement progressif du rein des chats atteints par des kystes remplis de liquide. Le nombre et la taille de ces kystes augmentent avec l'âge du chat et lorsque le tissu rénal n'est plus suffisamment présent pour assurer les fonctions d'épuration, il se développe une insuffisance rénale chronique incurable. Cette maladie se traduit par des symptômes

variés dont : dépression, perte d'appétit, léthargie, vomissements, polydipsie (augmentation de la prise de boisson), polyurie (augmentation du volume des urines), perte de poids.

Le rythme de croissance et de multiplication des kystes est variable d'un chat à un autre. Aussi, la date d'apparition des symptômes d'insuffisance rénale peut être très variable, allant en moyenne de 2 à 10 ans. Il n'existe pas de traitement spécifique de la PKD.

La HCM

La HCM féline est une maladie de l'adulte et du jeune adulte. La majorité des chats est asymptomatique jusqu'au développement d'une insuffisance cardiaque congestive aiguë (arythmies, œdème pulmonaire, épanchement pleural, thrombose artérielle associée). La HCM peut être découverte fortuitement lors d'un examen clinique de routine, par l'audition d'un souffle cardiaque ou d'un bruit de galop. Dans certains cas, léthargie et anorexie ou difficultés respiratoires (dyspnée, toux) sont les seuls symptômes. Enfin, certains chats atteints de HCM sont sujets à des pertes de connaissance (syncopes) ou meurent brutalement en l'absence d'autres signes cliniques. En effet, elle est souvent muette cliniquement et peut se traduire par une paralysie ou mort subite.

Pour un chat d'une race où il n'existe pas de test génétique de dépistage (autre qu'un Maine ou un Ragdoll), on peut faire pratiquer un examen échocardiographique, complété par un Doppler conventionnel, réalisé par un vétérinaire spécialisé en cardiologie.

La litière

Un chat est naturellement propre et exigeant envers sa litière. Dans le jardin ou la nature, il cherche un coin tranquille pour déposer ses excréments, mais dans notre cas, à l'intérieur, il s'agit d'un bac plus ou moins sophistiqué garni de litière de votre choix.

La litière de votre chat doit être dans un endroit tranquille, à l'abri du passage, il est préférable de ne pas le déplacer. Il doit être suffisamment haut pour que le chat puisse gratter et recouvrir ses excréments sans envoyer de la litière sur le sol. L'idéal est un bac couvert pour respecter son intimité.

La litière elle-même peut être en terre de jardin, en sable, ou en litière vendue en commerce. Certaines sont réutilisables car vous retirez avec une pelle les crottes et les pipis qui agglomèrent la litière, formant une boule. Vous pouvez utiliser de la sciure (de bois NON traitée car TOXIQUE) ou des copeaux dépoussiérés vendus en coopérative agricole (attention, le chat va tout de même en répandre à l'extérieur de son bac, c'est très léger ! L'avantage est que sa bonne odeur de bois couvre naturellement l'odeur des excréments et que l'on peut la changer tous les jours à petit coût). Il faut régulièrement laver et désinfecter le bac à litière, de préférence à l'eau de javel car le chat aime son odeur, cela l'invite à y

retourner. Vous pouvez aussi utiliser des sacs en plastique en fond de litière, vous n'avez plus qu'à l'enlever et en mettre un autre vide et propre !! (ce n'est pas très écolo toutefois !). En général, le chaton aura appris avec sa maman à utiliser le sac à litière et saura être propre tout de suite.

L'éducation

Un chat doit apprendre à ne pas monter sur la table ! Ne laissez pas votre chaton prendre des habitudes qui vous gêneront par la suite ! Soyez ferme tout de suite !

Pour sanctionner un mauvais comportement, utilisez un petit vaporisateur rempli d'eau et appuyez sur la gâchette pour le pulvériser d'eau. Il n'aimera pas trop cela et évitera les actions qui lui valent ce désagrément.

La nourriture

Votre chaton est un petit carnivore, particulièrement exigeant sur la qualité de son alimentation ; son alimentation doit être presque exclusivement carnée avec des besoins en acides aminés (arginine et taurine), en acides gras, en vitamines A, D, E, K et B.

L'idéal est de lui donner un aliment croquettes pour chaton (kitten) : notre élevage nourrit les adultes comme les chatons avec du HILLS ou VIRBAC ou ROYAL CANIN.

Attention à la qualité de vos croquettes : certains produits bas de gamme ne sont pas équilibrés sur le magnésium, le phosphate, etc., et l'excès de ces minéraux peut engendrer des calculs rénaux et urinaires chez les chats prédisposés.

Si vous décidez de nourrir votre chat à base de matières premières, vous devez vous informer sérieusement sur les besoins et les rations.

Si vous voulez faire plaisir à votre chat, faites légèrement poêler un petit bout de poulet, de saumon que vous couperez en petits morceaux. Il raffole des crevettes décortiquées, du thon en boîte, du poisson en général. Les chats sont plus gourmets que les chiens.

Un chat ne mange pas gloutonnement comme certains chiens, mais croque croquette après croquette puis après quelques bouchées, il s'en va jouer ou dormir et reviendra plusieurs fois par jour pour grignoter.

N'oubliez jamais de laisser à proximité de l'eau bien propre à volonté, même si votre chat ne semble pas boire beaucoup.

Les boîtes, barquettes et sachets d'aliments humides sont juste considérés comme friandises et compléments en vue de « faire plaisir » et d'apporter un peu d'hydratation par grande chaleur. Ces aliments s'abîment vite et ne doivent pas traîner dans la gamelle plus d'une heure. Ensuite, jetez-les !

Si votre chat ne sort pas manger de l'herbe en extérieur (notamment du chiendent), faites pousser quelques graines d'orge dont il dégustera les jeunes pousses.

Le chat adore la cataire et d'autres plantes labiées ; il se roule dedans car cela lui procure une extase olfactive.

Le couchage

Le chat aime dormir à différents endroits, il fait toujours comme il a envie.

Les jouets et jeux

Une simple boulette de papier peut faire son régal, les balles aussi, surtout celles avec un grelot à l'intérieur. Un bout de laine, une plume, un carton. Attention aux pelotes de laine et aux sacs avec lesquels ils peuvent s'étrangler.

Enfin, et pour conclure, n'oubliez pas les règles strictes d'hygiène pour votre chat à savoir vous laver les mains dès que vous rentrez de l'extérieur, et de vous laver les mains si vous devez manger après avoir touché l'animal. Rangez les chaussures dans un endroit afin que votre chaton ne soit pas en contact avec la semelle des chaussures où le typhus a pu se déposer, bien veiller au rappel de vaccins tous les ans à la date anniversaire du dernier vaccin, bien vermifuger avec du Stronghold ou Milbemax (dose en fonction du poids) 2 fois par an et surtout tous les mois les mois d'été, là où il y a des moustiques.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter votre éleveur ! N'attendez pas que la situation dégénère ! Investissez-vous, votre chat ne vit que pour vous !

V Van Hecke